



CONSEJO PRÁCTICO

Marzo 2017

Proteja su césped de la “pata de gallina”

El mes de marzo es clave en la planificación del mantenimiento de nuestro césped, ya que las subidas de temperatura y las precipitaciones típicas de este mes provocan la germinación de muchas semillas de malas hierbas anuales como la *Digitaria sanguinalis* conocida por muchos como “pata de gallina”.

Esta mala hierba es una gramínea originaria de África, lo cual nos indica que su ciclo de vida se dará en condiciones cálidas. En la zona del mediterráneo suele comenzar a nacer por el mes de marzo, aunque debemos estar alerta porque algunos años las condiciones climáticas son propicias para que germine con anterioridad.

Para evitar que invada nuestro jardín lo mas importante será tener un césped sano y denso, ya que un césped pobre pone el suelo al descubierto facilitando su colonización por parte de las malas hierbas. Lograremos formar un tapiz denso con labores culturales de calidad y un buen programa de nutrición.

Ademas de las labores culturales, también existen soluciones químicas para cuando sea necesario. Estas soluciones van a depender del tipo de césped que tengamos en nuestro jardín, así en césped de clima templado (Agrostis, Festuca, Raygrass o Poa) podrá ser tratada con herbicidas post-emergentes como los compuestos por *Fenoxaprop-p Etil*. Esto es mas difícil en césped de clima cálido (Grama, Bermuda, Kikuyo o Paspalum), por lo que recurriremos a tratamientos pre-emergentes para evitar la germinación de la “pata de gallina” cuya composición es *Pendimetalina*.

Es muy importante saber elegir bien el herbicida que vamos a usar, ya que no todos los formulados con *Pendimetalina* son igual de efectivos. También es fundamental hacer los tratamientos en las fechas marcadas en nuestro calendario y siempre regar inmediatamente a continuación del tratamiento. Un programa estándar de tratamientos con *Pendimetalina* 33% para su jardín sería el siguiente: Aplicaciones en marzo, mayo y julio a una dosis de 750ml a los 100 litros (para 1000m²).

* La dosis y la frecuencia de aplicaciones varía mucho en función de parámetros como el tipo de suelo, condiciones climáticas, especie cespitosa, etc. por lo que le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para juntos hacer un óptimo programa de tratamientos.

Escrito por Don Mariano Carreras Rodríguez